

防除用医薬部外品



粉末ワルファリン殺鼠剤

メリーネコPCⅡ

■有効成分

3-(α -アセトニルベンジル)-
4-ヒドロキシマリン …0.1%
(ワルファリン)

■外観

淡赤色粉末



メリーネコPCⅡについて


本剤は刺激性の少ない3-(α -アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシマリンを主剤として、ネズミの好むシードを数種類配合しており、喫食が非常に良い殺鼠剤です。

特長

- ① 数種類のシードを配合しており、ネズミは好んで種を食べるとき、種に付着している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。
- ② シード以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。
- ③ 粉はネズミの体に付着し、ネズミがグルーミング（体をなめること）により、薬剤が摂取される効果も併せ持っています。
- ④ ネズミは忌避することなく食べ続け、徐々に内出血を起こし、殊に眼底出血で視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向にあります。
- ⑤ 人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、防除用医薬部外品の殺鼠剤です。

使用方法

- あらかじめネズミの餌となるものを全て片付けてください。
- ネズミの出入りする場所の物陰に、本品10~20gを3~5カ所に配置してください。
翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び配置してください。
これをネズミが食べに来なくなるまで繰り返し行なってください。
- ネズミのよく出回るところ(台所、流し下、床下、押入れ、物置等)に配置し、ネズミは3~6日食べ続けて死にますから、減った量だけ毎日補給してください。
減らなくなった時、ネズミの駆除は完了しています。



- * 発情期（天井裏で騒いでいる時）には配餌しても食べないことがあります。
- * ネズミは警戒心が強く、2~7日間食べないことがありますが続けてください。

● 包装

1ケース：10kg入、1kg袋入×10

製造販売元

大丸合成薬品株式会社

〒381-1222 長野市松代町豊栄6320-1(豊栄工場)

TEL 026-278-2489(代)

FAX 026-278-4678

取扱店